


### Monitoring Lebensraumtypen 2008

#### Biototypen

- (WB) Bruchwald und -gebüsch (§)
- (WE) Feucht- und Sumpfwald (§)
- (WM) mesophytischer (Buchen-)Wald
- (WG) sonstiges Gebüsch (§?)
- (WP) Pionierwald §?
- (HW) Knick, Wallhecke (§)
- (HG) sonst. Gehölz
- (FB) Bach §?
- (FG) künstl. Fließgewässer, Gräben
- (FT) Tümpel (§)
- (FK) Kleingewässer (§)
- (FS) See §?
- (NS) Niedermoor Sumpf (§)
- (NR) Landröhricht §?
- (GM) mesophiles Grünland
- (GN) seggen- und binsenreiche Naßwiese (§)
- (GF) sonst. Feucht- und Naßgrünland
- (GI) artenarmes Intensivgrünland
- (AA) Acker
- (RH) (halb-)ruderaler Gras- und Staudenflur
- (SB) Stadtgebiet
- (SD) Dorfgebiet
- (SG) (sonstige) Grünfläche
- (SP) Grün- und Parkanlage
- (SV) Verkehrsanlage / -fläche

Datenquelle:  
Daten: PBM  
Legende: LLUR



## Managementplan

1322-391 / Treene Winderatter See bis Friedrichstadt  
und Bollingstedter Au  
Teilgebiet: Winderatter See und Kielstau

Karte 2a - Bestand - Blatt 3-5



Ministerium für Energiewende,  
Landwirtschaft, Umwelt  
und ländliche Räume  
des Landes Schleswig-Holstein



Maßstab: 1 : 5.000

Stand: 04.10.2012

Bearbeitung:  
GFN



Kartengrundlage: DGK5-V, ©LVermGeo-SH

fachlich: I. Eiseid

kartogr./GIS: V. Pieper