


VORENTWURF

Biotoptypen nach FFH-Monitoring 2008

- W Wälder, Gebüsche
- WB Bruchwald und -gebüsch
- WG Sonstiges Gebüsch
- WF Sonstiger flächenhaft nutzungsgeprägter Wald
- WP Pionierwald
- H Gehölze und sonstige Baumstrukturen
- HW Knicks, Wallhecken
- HG Sonst. Gehölze
- F Binnengewässer
- FV Verlandungsbereiche
- FF Fluß
- FG Künstl. Fließgewässer, Gräben
- FK Kleingewässer
- FW Nat. oder naturgepr. Flachgewässer, Weiher
- FS Seen
- M Hoch- und Übergangsmoore
- MH Hoch- und Übergangsmoore
- MS Moorstadien
- N Gehölzfr. Biotope der Niedermooere, Sümpfe und Ufer
- NS Niedermooere, Sümpfe
- NR Landröhrichte
- G Grünland
- GM Mesophiles Grünland
- GN Seggen- und binsenreiche Naßwiesen
- GF Sonst. Feucht- und Naßgrünland
- GI Artenarmes Intensivgrünland
- R Ruderalfluren
- RH (Halb-)Ruderales Gras- und Staudenfluren
- S Siedlungsbiotope
- SV Biotop der Verkehrsanlage/Verkehrsfläche
- SA Biotop der Abgrabungs- und Aufschüttungsfläche

 Projektgebiet



Managementplan

FFH-Gebiet DE 1322-391 "Treene Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au" und das EU-Vogelschutzgebiet DE 1622-493 "Eider-Treene-Sorge-Niederung" - Teilgebiet NSG "Wildes Moor bei Schwabstedt" -

Karte 2 - Biotoptypen -



SH  Schleswig-Holstein
Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume

Maßstab: 1 : 6.000
Stand: 15.10.2015
Bearbeitung:
Projektgruppe
NATURA 2000

Kartengrundlage: DGK5-V, ©LVerGeo-SH

fachlich: Mordhorst kartogr./GIS: Mordhorst